

AANVRAAGFORMULIER CYTOSTATICA

Protocol hklBEACOPPesc21	BEACOPP escalated Bij Morbus Hodgkin Éénmaal per 3 weken. Totaal 2-6 keer.
Kuurnummer	
Lengte	
Lichaamsgewicht	
Lichaamsoppervlak(m ²)	
Naam arts en sein	
Afdeling	Oncologie

Medicatie	Toedieningswijze	Dosering	Oplossen in	Dag van toediening
Cyclofosfamide	i.v.	1250 mg/m ²	≤1810mg in 100 ml NaCl 0,9% >1810 mg in 250 ml NaCl 0,9%	1
Doxorubicine	i.v.	35 mg/m ²	100 ml NaCl 0,9%	1
Etoposide	i.v.	200 mg/ m ²	1000 ml NaCl 0,9%	1, 2 en 3
Procarbazine	p.o.	100 mg/ m ²		1 t/m 7
Prednisolon	p.o.	40 mg/ m ²		1 t/m 14
Vincristine	i.v.	1,4 mg/m ² max 2 mg	100 ml NaCl 0,9%	8
Bleomycine	i.v.	10 mg U/m ²	100 ml NaCl 0,9%	8
Ondersteunende medicatie				
Filgrastim	s.c.	≤80 kg, 300 µg/dag > 80 kg, 480 µg/dag		8 t/m 15
Pantoprazol	p.o.	1x dd 40 mg		Gedurende gehele behandeling
Co-trimoxazol	p.o.	1x dd 480 mg		Gedurende gehele behandeling

Cumulatieve dosering TOT deze kuur (INCLUSIEF vroegere behandelingen!)

O doxorubicine mg/m² grens 450 mg/m²
O bleomycine U/m² grens 400 U

Cumulatieve dosering TOT EN MET deze kuur

O doxorubicine mg/m²
O bleomycine U/m²

Medicatie	Dosering	Dosisreductie/Opmerking	Dosis	Dag	Datum	Paraaf vpk 1	Paraaf vpk 2
Cyclofosfamide	1250 mg/m ²		mg	1			
Doxorubicine	35 mg/m ²		mg	1			
Etoposide	200 mg/ m ²		mg	1			
Etoposide	200 mg/ m ²		mg	2			
Etoposide	200 mg/ m ²		mg	3			
Vincristine	1,4 mg/m ² max 2 mg		mg	8			
Bleomycine	10 U/m ²		mg	8			

Paraaf arts:	
Paraaf apotheker:	

Versie: 1.0
Revisiedatum31-01-2022

Autorisatie:	Arts	Apotheker	VS
Paraaf:	KdH	MS	LD