

AANVRAAGFORMULIER CYTOSTATICA

Protocol <b>maaPRAM28</b>	<b>Paclitaxel (Taxol®) + Ramucirumab Bij maagcarcinoom</b>  Éénmaal per 4 weken.
Kuurnummer	
lengte	
lichaamsgewicht	
lichaamsoppervlak(m <sup>2</sup> )	
naam arts en sein	
afdeling	

medicatie	Toedieningswijze	Dosering	Oplossen in	Dag van toediening
Paclitaxel	i.v.	80 mg/m <sup>2</sup>	< 150 mg in 250 ml NaCl 0,9% ≥ 150 mg in 500 ml NaCl 0,9%	1, 8 en 15
Dexamethason	i.v.	1 x 20 mg	100 ml NaCl 0,9%	15 min vóór Paclitaxel toediening
Clemastine (Tavegil®)	i.v.	2 mg	100 ml NaCl 0,9%	30 min voor Ramucirumab toediening
Ranitidine (Zantac®)	i.v.	50 mg	100 ml NaCl 0,9%	30 min vóór Paclitaxel toediening
Ramucirumab	i.v.	8 mg/kg lichaamsgewicht	250 ml NaCl 0,9%	1 en 15

Medicatie	Dosering	Dosisreductie/Opmerking	dosis	Dag	Datum	Paraaf vpk 1	Paraaf vpk 2
Paclitaxel	80 mg/m <sup>2</sup>		mg	1			
Ramucirumab	8 mg/kg		mg	1			
Paclitaxel	80 mg/m <sup>2</sup>		mg	8			
Paclitaxel	80 mg/m <sup>2</sup>		mg	15			
Ramucirumab	8 mg/kg		mg	15			

Paraaf arts:	
Paraaf apotheker:	

Versie: 1.0  
Revisiedatum: 27-07-2018

Autorisatie:	Arts	Apotheker	Onc verpl.
Paraaf:	VL	MS	DD