

	HbA	HbS	HbC	HbF	HbA2	HbH	opmerking
	$\alpha_2\beta_2$ (func β -keten nodig)			$\alpha_2\gamma_2$	$\alpha_2\delta_2$		
normaal of b/b-silent	95-98	0	0	<1	2.5 ± 0.2		
beta minor (= b / b0 of b / b+ tenzij tevens aa/aaa)	90-95	0	0	bij 50% verhoogd: 1-5	>3.5 - 8		milde anemie: Ht >30, MCV <75, eryt., target cells, soms milde hemolyse, soms splenomegalie tijdens zwangerschap soms transfusie
beta intermedia (=varianten met beta-mild, minor met alfa-thal, of beta/delta)	0-80%	0	0	>10 4-7 (beta/delta 0%)			vaak hemolyse, Ht <30 (of Hb <6,3), evt. hoog ferritine, cardiale problemen, botafwijkingen, hepatosplenomegalie
beta major (= b0 / b0 of b0 / b+ of b+ / b+)	0	0	0	Vrijwel 100	<4		<2e jr gevonden, Tx-afhankelijkheid
alfa minima (aa/a-) en minor (aa/- of a-/a-)	normaal			soms +	kan <2, dan d.d. Fe-def	volw: 0	
HbAS	50-70	35-45	0	<2	<3.5		geen hemolyse, hematologisch niet herkenbaar
HbAS met alfa-thalassemie		21-35					
HbS β +	5-30	65-90	0	2-10	>3.5		
HbS δ 0	0	80-92	0	2-15	>3.5		
HbSC	0	45-50	45-50	1-8	<3.5		
HbSS	0	85-95	0	2-15	<3.5		
HbH-ziekte					5-30		
HPFH				verhoogd			

	genotype	MCV	anemie
stille drager / minima	$\alpha\alpha/\alpha-$	75-85	geen
minor	$\alpha\alpha/-$ $\alpha-/a-$	laag	+/-
HbH-ziekte	$\alpha-/--$	laag	matig
hydrops foetalis	--/-/-	laag	fataal

Koen de Heer