

	(R)-ABVD bij Hodgkin lymfoom, infuuslijst	Versie 4
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	----------

Datum:
Gewicht:
Lengte:
LO/m²:
Kuur nr:

Naamsticker:

RITUXIMAB

Bij deze kuur kan rituximab toegevoegd worden. Indien dit het geval is bij patiënt, zie dan [de generieke infuuslijst rituximab](#).

[medisch protocol](#)

EXTRAVASATIE

Zie [werkinstructie Calamiteiten cytostatica](#)

Akynzeo geven voor start chemokuur

Medicatie	Oplossing	Tijdsduur	Tijd	paraaf
	500 ml NaCl 0,9%			
Hydrocortison 100 mg	100 ml NaCl 0,9%			
	infuussysteem doorspoelen			
Doxorubicine	100 ml NaCl 0,9%	z.s.m.		
	infuussysteem doorspoelen			
Vinblastine	100 ml NaCl 0,9%	5 min		
	infuussysteem doorspoelen			
Dacarbazine (DTIC®)	250 ml NaCl 0,9%	z.s.m.		
	infuussysteem doorspoelen			
Bleomycine	100 ml naCl 0,9%	30 min		
	infuussysteem doorspoelen			

Aandachtspunten:

- Controleer voor elke gift of de naald goed in het bloedvat ligt, Doxorubicine veroorzaakt ernstige necrose bij extravasatie
- Doxorubicine en Dacarbazine vormen een neerslag met heparine (let op bij gebruik van implanteerbare toedieningssysteem, ruim naspoelen met NaCl 0,9%)
- De urine kan roodgekleurd zijn door de Doxorubicine
- Doxorubicine buiten de invloed van licht bewaren
- **Dacarbazine is lichtgevoelig en kan pijnlijk zijn bij het inlopen. Zo snel mogelijk als de patiënt het verdraagt in laten lopen.**
- **LET OP: er moet gebruik gemaakt worden van een speciaal cytostatica-infuussysteem met UV filter of de lijn tot aan de insteekplaats inpakken met aluminiumfolie.**
- **Een grote venflon in een grote ader inbrengen, liefst in de elleboog en fixeren met een spalk.**
- Mondverzorging volgens protocol

Opdrachten:

- Voor elke nieuwe kuur op poli bij internist
- Lab volgens [medisch protocol](#)