

Doel

Bij hemochromatose: ijzeronttrekking

Bij polycythaemia vera: verlaging bloedgehalte, (Hb of Ht)

Toepassingsgebied

Dagbehandeling

Indicatie

- Hemochromatose: een aangeboren, erfelijke aandoening, waarbij de patiënt in de loop van het leven steeds meer ijzer opslaat in de organen, met schade aan lever, hart, alvleesklier.
- Polycythaemie vera: verworven aandoening, waarbij de patiënt een te hoog bloedgehalte opbouwt, met daardoor een verhoogd risico op trombose.

Contra-indicatie

- Hypotensie
- Anaemie
- Ernstige hartfalen
- Zwangerschap (tenzij ernstige symptomatologie)

Complicaties

- Hypotensie
- Vagale klachten
- Cave angineuze klachten

Bevoegdheden

- Verpleegkundige.
- Verpleegkundige met bekwaamheidsverklaring.
- Poortarts.

Benodigd materiaal

- Alcohol 70%
- Gazen
- Celstofmatje
- Stuwband
- Niet-steriele handschoenen
- Venflon roze/groen
- Afnamesysteem met luerlock
- Pleister
- Lab.aanvraag aanwezig dan (zie bijlage)
- Bloedafnamebuis, zie labformulier voor kleuren, afnamenaald (blauw) en gele huls (vacutainer)
- Labformulier (Hb, Ht, ferritine)

Aandachtspunten

- Digitale status i.v.m. hoeveelheid bloedafname

Werkwijze

Vorbereiding

- Eerste keer: patiënt informeren over doel, de procedure zelf en de mogelijke bijwerkingen
- Bloeddrukdaling tijdens aderlating t.g.v. vasovagale reactie, stop bloedafname
- Bloeddrukdaling na de aderlating bij te snel overeind komen (patiënt laten liggen)
- Nabloeden uit punctieplaats (opnieuw afdrukken en opnieuw verbinden)

- Informeren bij patiënt naar eventuele vorige reacties op de aderlating
- In digitale status kijken naar de hoeveelheid bloed dat er afgenomen moet worden.

Uitvoering

- Patiënt op bed of stoel laten plaatsnemen.
- Celstofmatje onder arm en stuwband om de bovenarm.
- Huid elleboogvene desinfecteren.
- Baxter afnameset naast de patiënt leggen.
- Naald van het afnamesysteem in de elleboogvene plaatsen en met pleister vastplakken (naald)
- Indien arts voorschrijft, bloed afnemen
- Stuwband losmaken met de vrije hand.
- Naald verwijderen, punctieplaats met gaasje afdrukken.
- Punctieplaats met pleister of gaasje stevig afplakken.
- Baxter systeem met beschermde naald in blauwe container met rode deksel deponeren
- Patiënt eerst rechtop laten zitten en wat te drinken geven.
- SAP bij verslag je bevindigen noteren, hoeveelheid bloed en eventuele bijzonderheden.
- Patiënt kan naar huis als hij/zij zich goed voelt en de punctieplaats niet nabloedt.

Nazorg

- Indien patiënt zich goed voelt en punctieplaats niet nabloedt, mag patiënt met ontslag

Bijlagen

- Afnamenaald op vacutainer draaien en in aftappunt klikken
- Bloedafnamebuis in vacutainer klikken (buis vult zich vanzelf)
- **(gele vacutainer niet weggooien)**
- Naam en geboortedatum op bloedafnamebuis schrijven en met labformulier naar lab brengen