

	<h2>BEACOPP escalated, infuuslijst</h2>	Versie 1
---	---	----------

Patiëntensticker:

BEACOPP escalated

Datum:
Gewicht:
Lengte:
LO/m²:
Kuur nr:

Dag 1

Lijn 1	Medicatie	Oplossing	Tijdsduur	Tijd	Paraaf	Paraaf
0:00		500 ml NaCl 0,9%				
0:00	Akynzeo®	Per os				
		50 ml NaCl 0,9% doorspoelen				
0:15	Doxorubicine	50 ml NaCl 0,9%	10 min.			
0:25		Infuussysteem doorspoelen				
0:30	Cyclofosfamide	100/250 ml NaCl 0,9%	30 min.			
1:00		Infuussysteem doorspoelen				
1:15	Etoposide	1000 ml NaCl 0,9%	60 min.			
2:15		Infuussysteem doorspoelen				

Dag 2

Lijn 1	Medicatie	Oplossing	Tijdsduur	Tijd	Paraaf	Paraaf
0:00		500 ml NaCl 0,9%				
0:00	Etoposide	1000 ml NaCl 0,9%	60 min.			
1:00		50 ml NaCl 0,9% doorspoelen				

Dag 3

Lijn 1	Medicatie	Oplossing	Tijdsduur	Tijd	Paraaf	Paraaf
0:00		500 ml NaCl 0,9%				
0:00	Etoposide	1000 ml NaCl 0,9%	60 min			
1:00		50 ml NaCl 0,9% doorspoelen				

	BEACOPP escalated, infuuslijst	Versie 1
---	---------------------------------------	----------

Dag 8

Lijn 1	Medicatie	Oplossing	Tijdsduur	Tijd	Paraaf	Paraaf
0:00		500 ml NaCl 0,9%				
0:00	akynzeo	Per os				
		50 ml NaCl 0,9% doorspoelen				
0:15	Vincristine	50 ml NaCl 0,9%	5 min.			
0:20		Infuussysteem doorspoelen				
0:25	Bleomycine	100 ml NaCl 0,9%	30 min.			
0:55		Infuussysteem doorspoelen				

Aandachtspunten:

- Controle vitale functies (T, RR, P evt. Saturatie)
- Controleer vóór elke gift of de naald goed in het bloedvat ligt
- Controleer cytostatica aan het bed met patiënt
- Mondverzorging volgens protocol

Specifiek voor de kuur:

- Vanwege de rode verkleuring van het traanvocht wordt de patiënt afgeraden om contactlenzen te dragen tot 1 week na de toediening van de doxorubicine
- Nadat een infuus op een waaknaald is gezet, mogen er geen vasotoxische stoffen meer worden toegediend zoals anthracyclines en vinca-alkaloiden. In deze kuur doxorubicine en vincristine.
- Dag 1 en 8: na het inlopen van de chemotherapie: infuus verwijderen i.v.m. verhoogd risico op flebitis door doxorubicine en vincristine.
- Dag 2: na het inlopen van de chemotherapie; waaknaald voor de etoposide op dag 3.
- Port a cath: doxorubicine vormt neerslag met heparine, dus goed naspoelen na de doxorubicine.
- Patiënt adviseren de prednisolon 's ochtends in te nemen.

Opdrachten

- Voor elke kuur op poli bij hematoloog
- Lab volgens medisch protocol