	<h2>Brentuximab, Infuuslijst</h2>	Versie 1
---	-----------------------------------	----------

patiëntensticker:

### Brentuximab bij M. Hodgkin

Datum:  
Gewicht:  
Lengte:  
LO/m<sup>2</sup>:  
Kuur nr:

#### 30 min voor start Brentuximab, Paracetamol 1000 mg

Medicatie	Oplossing	Tijdsduur	Tijd	Paraaf dag 1
Hydrocortison 100 mg	100 NaCl 0,9%			
	500 ml NaCl 0,9%			
2 mg Clemastine 30 min voor start Brentuximab	50 ml NaCl 0,9%	5 min		
	50 ml NaCl 0,9%			
<b>Brentuximab</b>	100/250 ml NaCl 0,9%	30 min		
	100 ml NaCl 0,9%; infuussysteem doorspoelen			
	NaCl 0,9% spoelen en waakinfluus			

#### Lab per kuurdag in chronologische volgorde :

Dag 1 van iedere kuur (cito): Hb, Tr, L, neutrofielen


#### Verpleegkundige instructies / Kuur gerelateerde controles:

##### Verpleegkundige aandachtspunten

- Patiënt informeren t.a.v. kuur (checklist), bijwerkingen (met name neuropathie) en schema
- Controle vitale functies (Temp, RR, Pols evt. Saturatie)
- Lengte en gewicht meten
- Instructie mondverzorging, materiaal uitreiken
- Chemo-infuussysteem: 500 ml NaCl 0,9% + driewegkraan en noodlijn NaCl 0,9%
- Controleer voor de toediening of het infuus goed in het vat ligt.
- Controleer cytostatica aan het bed met patiënt.
- Informeren wat te doen bij klachten en/of vragen.
- Controleer of volgende kuur gepland is.

##### *specifiek voor de kuur*

- Na het inlopen van brentuximab vedotin naspoelen met 100 ml NaCl 0,9%
- Tijdens het inlopen van brentuximab vedotin moet de patiënt regelmatig gecontroleerd worden i.v.m. mogelijke acute reacties. Controleer op indicatie de pols, bloeddruk en temperatuur.
- Noodset klaarzetten
- Na het inlopen moet de patiënt nog minimaal een uur geobserveerd worden i.v.m. mogelijke late reacties. 60 minuten na het inlopen van de brentuximab vedotin controles nogmaals herhalen endaar na, in overleg met de arts, het infuus verwijderen.
- Acute reacties zijn te verwachten op basis van allergie. Bij het optreden van bijwerkingen: infuus direct stopzetten, verder gaan met escape/ zijlijn met NaCl 0,9% , arts waarschuwen en controles T/P/RR uitvoeren. Na overleg met arts infusie op halve snelheid herstarten.
- Indien een patiënt last had van bijwerkingen bij een voorgaande toediening dan moet de vervolgoediening op halve snelheid gestart worden. Volg de instructies van de arts ten aanzien van de toediening en preventieve maatregelen. Wanneer er bij de voorgaande toediening geen bijwerkingen zijn opgetreden dan kunnen de vervolgoedieningen, net als de eerste toediening in een half uur plaatsvinden.

 <p>Flevoziekenhuis Almere</p>	<b>Brentuximab, Infuuslijst</b>	Versie 1
---	---------------------------------	----------

- Ook bij de vervolgtodieningen van brentuximab vedotin kunnen bijwerkingen en/of complicaties ontstaan; ook als de patiënt eerdere toedieningen zonder problemen heeft gekregen. Patiënt hier uitleg over geven.
- Patiënt uitleg geven over de mogelijkheid van het ontstaan van overgevoeligheidsreacties na de infusie (late infusiereactie).
- Patiënt dient tot 6 maanden na de behandeling met brentuximab vedotin voorbehoedsmiddelen te gebruiken.
- Bij hoge tumorload patiënt adviseren om minimaal 2,5 liter per dag te drinken. Eventueel wordt allopurinol (1 x daags 300 mg) voorgeschreven.

**Opdrachten:**

- Voor elke kuur op poli bij internist
- Lab volgens [medisch protocol](#)