

	(R)- CHOP BIJ NHL infuusschema	Versie 3
---	---------------------------------------	----------

naamsticker:

Datum:
Gewicht:
Lengte:
LO/m²:
Kuur :

RITUXIMAB

Bij deze kuur kan rituximab toegevoegd worden. Indien dit het geval is bij patiënt, zie dan de [generieke infuuslijst rituximab](#).

[medisch protocol](#)

Extravasatie: zie protocol [Calamiteiten Chemotherapie](#).

Akynzeo oraal geven voor start chemokuur

Medicatie	Oplossing	Tijdsduur	Tijd	Paraaf
LIJN 1				
	500 ml NaCl 0,9%			
Medicatie	Oplossing	Tijdsduur	Tijd	Paraaf
Prednison 100 mg	100 ml NaCl 0,9%	15 min.		
	50 ml NaCl 0,9% lijn naspoelen			
Doxorubicine	100 ml NaCl 0,9%	z.s.m.		
	50 ml NaCl 0,9% lijn naspoelen			
Vincristine	100 ml NaCl 0,9%	5 min		
	50 ml NaCl 0,9% lijn naspoelen			
Cyclofosfamide	100 ml NaCl 0,9%	15 min		
	50 ml NaCl 0,9% lijn naspoelen			
LIJN 2				
	500 ml NaCl 0,9% te gebruiken bij evt reacties			

Aandachtspunten:

- Controleer vóór elke gift of de naald goed in het bloedvat ligt
- Doxorubicine en vincristine kunnen bij extravasatie ernstige necrose veroorzaken, beiden snel laten inlopen, langere duur geeft meer kans op vaatirritatie.
- Doxorubicine vormt een neerslag met heparine (let op bij het gebruik van implanteerbare toedieningsystemen, ruim naspoelen met NaCl 0,9%)
- De urine kan rood gekleurd zijn door de doxorubicine
- Doxorubicine buiten de invloed van licht bewaren
-

Opdrachten:

- Voor elke nieuwe cyclus op poli bij hematoloog
- Voor iedere cyclus lab. volgens [medisch protocol](#)