

	<h2>COPAD bij Burkitt Lymfoom</h2>	Versie 1
---	------------------------------------	----------

Datum:
Gewicht:
Lengte:
LO/m²:
Kuur :

Naamsticker

RITUXIMAB

Bij deze kuur wordt rituximab toegevoegd, zie de [generieke infuuslijst rituximab](#).
[Medisch protocol](#)

EXTRAVASATIE

Zie [calamiteiten cytostatica](#)

Akynzeo geven voor start chemokuur

Medicatie	Oplossing	Tijds duur	Tijd	Par. Dag 1	Par. Dag 2	Par. Dag 3	Par. Dag 4	Par. Dag 5	Par. Dag 6
Prednison Dag 1 t/m 5 p.o.									
	500 ml NaCl 0,9%								
	50 ml NaCl 0,9% lijn naspoelen								
Rituximab	250 ml NaCl 0,9%								
	50 ml NaCl 0,9% lijn naspoelen								
Vincristine	100 ml NaCl 0,9%	5 min.							
	50 ml NaCl 0,9% lijn naspoelen								
Adriamycine	100 ml NaCl 0,9%	5 min.							
	50 ml NaCl 0,9% lijn naspoelen								
Cyclofosfamide	100 ml NaCl 0,9%	15 min.							
	50 ml NaCl 0,9% lijn naspoelen								
	Venflon afdoppen								
Cyclofosfamide	100 ml NaCl 0,9%	15 min.							
LET OP, deze infuus zak pas 12 uur ná start vorige infusie cyclofosfamide geven!									
	50 ml NaCl 0,9% lijn naspoelen								
	Venflon afdoppen								

Aandachtspunten:

- Controleer vóór elke gift of de naald goed in het bloedvat ligt
- Doxorubicine en vincristine kunnen bij extravasatie ernstige necrose veroorzaken, beiden snel laten inlopen, langere duur geeft meer kans op vaatirritatie.



COPAD bij Burkitt Lymfoom

Versie 1

- Doxorubicine vormt een neerslag met heparine (let op bij het gebruik van implanteerbare toedieningsystemen, ruim naspoelen met NaCl 0,9%)
- De urine kan rood gekleurd zijn door de doxorubicine
- Doxorubicine buiten de invloed van licht bewaren
- Bij voorkeur de cyclofosfamide in 15 minuten toedienen, bij bolus injecties kunnen veel patiënten last krijgen van een loopneus, niezen, hoofdpijn of een vervelende smaak in de mond

Opdrachten:

- Voor elke nieuwe cyclus op poli bij hematoloog
- Voor iedere cyclus lab. volgens medisch protocol