

Middelen

Cyclofosfamide 2dd 250 mg/m² dag 1, 2, 3
Vincristine 2 mg i.v. dag 1,6
Adriamycine 60 mg/m² i.v. dag 1
Rituximab 375 mg/m² dag 4
Prednison 60 mg/m² p.o. dag 1 t/m 5

Indicatie

Burkitt-lymfoom

Mag zelfstandig verricht worden door

- Verpleegkundige
- Verpleegkundige met bekwaamheidsverklaring
- Arts-assistent Interne Geneeskunde

Kuurschema

In principe 1x per 3 weken.

Lever- en nierfunctie

Cyclofosfamide

Dosisaanpassing bij klaring onder de 10 mL/min: 75%.

Doxorubicine

Dosisaanpassing bij bilirubine ≥ 20 $\mu\text{mol/L}$.

Dosisaanpassing bij ASAT/ALAT $\geq 2,5$ x ULN.

ALAT/ASAT		Bilirubine (micromol/l)	Dosering
2,5 x ULN		-	75%
> 3 x ULN	Of	20-50	50%
-		51-85	25%
-		> 85	Geen toediening

Vincristine

Dosisaanpassing bij bilirubine ≥ 25 x ULN.

Bilirubine (micromol/l)	Doseirng Vincristine
< 25	100%
26-50	50%
> 50	25%

Rituximab

Beleid bij leverfunctiestoornis niet bekend.

Voorzichtig bij nierfunctiestoornis.

In principe wordt de dosis niet aangepast.

Aanbevelingen bij overgevoelighedsreacties

Zie ook [Crashkaart oncolytica](#).

Zie [infuuslijst rituximab](#).

Dosismodificatie schema

De dosering Vincristine wordt verminderd bij neurotoxiciteit.

De Doxorubicine wordt vervangen door Etoposide bij verminderde linker ventrikel ejectiefractie (<50%) of ontstaan van cardiotoxiciteit: CEOP.

Overweeg op hoge leeftijd doseringen aan te passen, in principe bij leeftijd >80 halveren maximale dosis Vincristine, dosis Doxorubicine en dosis Cyclofosfamide.

Hematologische toxiciteit

Zie richtlijn dosisreductie/uitstel bij hematologische toxiciteit.

Antibiotica

Geen.

Anti-emetica

5-HT-receptorantagonist-bevattend schema, zie anti-emetica schema.

Te realiseren voor de eerste kuur

Zie protocol NHL.

Zie protocol "te realiseren voor iedere eerste kuur chemotherapie in de hematologie"

Lab. controles

Hb, L, tr, diff, kreatinine, ASAT, ALAT, g-GT, AF voor iedere kuur.

Beschermende maatregelen t.a.v. excreta

Cyclofosfamide	3 dagen
Doxorubicine	6 dagen
Vincristine	2 dagen

Extravasatie en/of morsen

Altijd infuus stopzetten, naald in situ laten en arts waarschuwen.

Bij ontslag

- Laboratoriumaanvraag meegeven.
- Poli-afpraak bij hematoloog voor volgende kuur.
- Heropnamedatum.
- Recepten anti-emeticum en/of andere medicatie.
-

Gerelateerde documenten

Gerelateerde documenten

Richtlijnen:

- dosisreductie/uitstel bij hematologische toxiciteit

Protocollen:

- NHL
- "te realiseren voor iedere eerste kuur chemotherapie in de hematologie"
- anti-emetica schema

Werkinstructies:

- [Calamiteiten cytostatica](#)
- [Infuuslijst COPAD](#)

Formulieren/checklisten:

- [Crashkaart oncolytica](#)

Website's:

- [SIB op maat](#)

Literatuur

LMB 93-protocol

http://www2.hematologie-amc.nl/bestanden/hematologie/studieprotocollen/local_burkitt/local_burkitt_LMBA93.htm