

	<h2>CRD, infuuslijst</h2>	Versie 1
---	---------------------------	----------

KUUR 1

Dag 1, 2, 8, 9, 15 en 16

Medicatie	Dosis	Oplosmiddel (ml)	Inlooptijd	Bijzonderheden/ toedieningsinstructies
		500 ml NaCl 0,9%	90 min.	prehydratie
Carfilzomib		100 ml Glucose 5%	30 min.	
		500 ml NaCl 0,9%	90 min.	posthydratie

Aandachtspunten:

- Controle vitale functies (Temp, RR, Pols, evt. Saturatie)
- Nagaan bij patiënt of alle (vervolg) afspraken duidelijk zijn.

Specifiek voor deze kuur:

- Voor elke toediening beoordelen eventuele polyneuropathie.
- Glucose monitoring op dag 8 en 15 via vingerprik. Arts informeren indien bloedsuiker > 10 mmol/l).
- Hydratieschema:
 - Voor start carfilzomib check of vochtintake voldoende is geweest, **anders uitstel kuur!** (er dient ook **altijd** akkoord te zijn van VSO).
 - Tijdens de eerste kuur (dus de eerste 6 toedieningen) van carfilzomib dient er minimaal 500 ml NaCl 0,9% préhydratie en 500 ml NaCl 0,9% posthydratie gegeven te worden. Bij de volgende kuren volstaat naspoelen met 100 ml NaCl 0,9% **indien** het lab geen afwijkingen laat zien.
 - Patiënt adviseren dexamethason 's ochtends in te nemen.

Opdrachten:

- Voor elke nieuwe cyclus op poli bij hematoloog
- [Lab. volgens medisch protocol](#)