	Dose Adjusted (DA)-EPOCH-R, Infuuslijst	Versie 1
---	--	----------

patiëntensticker:

DA-EPOCH-R

Datum:
Gewicht:
Lengte:
LO/m²:
Kuur nr:

Dag 1


Lijn 1	Medicatie	Oplossing	Tijdsduur	Tijd	Paraaf	Paraaf
0:00		500 ml NaCl 0,9%				
0:00	Akynzeo®	Per os				
	Paracetamol 1000 mg	p.o.				
0:15	Clemastine 2 mg	bolus	5 min.			
0:25		50 ml NaCl 0,9% doorspoelen				
0:45	Rituximab	250 ml NaCl 0,9%	Toedienen vlg opbouwschema			
2:00		50 ml NaCl 0,9% doorspoelen				
2:15	+ Etoposide + Doxorubicine + vincristine	528 of 1056 ml NaCl 0,9%, afhankelijk van etoposide	24 uur In 1 zak			

Dag 1

Methotrexaat	15 mg	intrathecaal
Prednisolon	25 mg	intrathecaal

Dag 2 t/m 4

Lijn 1	Medicatie	Oplossing	Tijdsduur	Tijd	Paraaf	Paraaf
2:15		500 ml NaCl 0,9%				
2:15	+ Etoposide + Doxorubicine + vincristine	528 of 1056 ml NaCl 0,9%, afhankelijk van etoposide	24 uur In 1 zak			
1:00		50 ml NaCl 0,9% doorspoelen				

	Dose Adjusted (DA)-EPOCH-R, Infuuslijst	Versie 1
---	--	----------

Dag 5

Lijn 1	Medicatie	Oplossing	Tijdsduur	Tijd	Paraaf	Paraaf
2:00		500 ml NaCl 0,9%				
2:00	akynzeo	Per os				
2:15	Cyclofosfamide	100/250 ml	30 min.			
2:45		50 ml NaCl 0,9% doorspoelen				

Dag 5**Cytarabine intrathecaal 70 mg****Aandachtspunten:**

- Controle vitale functies (T, RR, P evt. Saturatie)
- Controleer vóór elke gift of de naald goed in het bloedvat ligt
- Controleer cytostatica aan het bed met patiënt
- [Mondverzorging volgens protocol](#)
- Bij ontslag: informatie en recept meegeven van anti-emetica en andere evt. medicatie en patiënt informeren wat te doen bij klachten en/of vragen

Specifiek voor de kuur:

- Bij start van de therapie rekening houden met tumorlysis
- Eerste rituximab toedienen dan de andere middelen
- Voor specifieke instructies omtrent de toediening van rituximab, wordt verwezen naar het moederprotocol [rituximab](#)
- **De doxorubicine, etoposide en vincristine zullen samen in 1 zak door de apotheek geleverd worden voor continue toediening à 24 uur met behulp van een infuuspomp.** De zak zal nooit helemaal leeg zijn n(buffer 40 ml), om lucht aanzuiging te voorkomen. Dit hoeft dus niet extra in te lopen!
- De cytostatica worden geleverd met een CADD systeem voor thuistoediening met een pomp. Indien de eerste cyclus klinisch wordt toegediend worden de cytostatica geleverd in een normale infuuszak en zullen de volgende cycli worden geleverd met een CADD systeem voor thuistoediening met een pomp.
- I.v.m. een maximale concentratie etoposide wordt bij een dosering etoposide ≤ 130 mg, een infuuszak met 568 ml (528 ml toedienen) geleverd en bij een dosering > 130 mg, 1096 ml (1056) ml toedienen).
- Iedere 24 uur wordt deze zak gewisseld in het ziekenhuis.
- Spuitinstructie geven i.v.m. start filgrastim op dag 6.

Opdrachten:

- Voor elke kuur op poli bij hematoloog
- [Lab volgens medisch protocol](#)