

	<h2>Fludarabine bij CLL of NHL</h2>	Versie 3
---	-------------------------------------	----------

Datum:  
Gewicht:  
Lengte:  
LO/m<sup>2</sup>:  
Kuur nr:

Naamsticker:

### Dag 1 t/m 5

Medicatie	Oplossing	Tijdsduur	Tijd	Paraaf Dag 1	Paraaf Dag 2	Paraaf Dag 3	Paraaf Dag 4	Paraaf Dag 5
	250 ml NaCl 0,9%							
Metoclopramide 10 mg	50 ml NaCl 0,9%	15 min						
	Infuussysteem doorspoelen							
<b>Fludarabine</b>	100 ml NaCl 0,9%	30 min.						
	Infuussysteem doorspoelen							
	<b>Venflon afkoppelen voor volgende dag</b>							

#### Aandachtspunten:

- Controleer voor elke gift of de naald goed in het bloedvat ligt
- **Patiënten die een bloedtransfusie nodig hebben en behandeld worden of zijn met fludarabine, dienen tot 1 jaar na stoppen van de behandeling alleen bestraalde bloedproducten toegediend te krijgen.**
- [Co-medicatie, zie medisch protocol](#)
- [Mondverzorging volgens protocol](#)

#### Opdrachten:

- Voor elke nieuwe kuur op poli bij hematoloog
- [Lab volgens protocol](#)