

Doel

Richtlijn Influenza

Patiëntenpopulatie

De volgende richtlijn betreft zowel patiënten met neutropenie als patiënten met een gestoorde cellulaire afweer.

Bij de volgende symptomen moet aan influenza worden gedacht in het influenza-seizoen:

- koorts >38.0, èn
- respiratoire symptomen

Preventie

Bij de bovengenoemde symptomen komen patiënten in aanmerking voor virusdiagnostiek: bij voorkeur, vanwege hogere sensitiviteit, neus- en keelwat, i.o.m. klinisch microbioloog.

Bewezen influenza: Oseltamivir 2 dd 75 mg 5 dagen.

Zieke immuungecompromiteerde patiënt met typische symptomen: Oseltamivir 2 dd 75 mg 5 dagen in afwachting van diagnostiek.

Niet-zieke patiënt: wacht diagnostiek af.

Bij twijfel: overleg met microbioloog.

Huisgenoot met bewezen influenza: overweeg patiënt ter profylaxe oseltamivir 2dd 75 mg 5 dagen voor te schrijven afhankelijk van mate van immuundeficiëntie.

Zie de richtlijnen van de ziekenhuishygiëne bij een patiënt met bewezen influenza

- op de polikliniek
- in de kliniek

Griepvaccinatie

Alle patiënten met een maligne hematologische ziekte dienen gevaccineerd te worden.

Tenzij:

- < 6 maanden geleden fludarabine of immunotherapie
- < 3 maanden geleden andere vormen van chemotherapie

Adviseer bij andere immuunsuppressieve therapieën wel te vaccineren, omdat niet goed bekend is of vaccinatie dan ook zonder effect is. Indien een patiënt niet in aanmerking komt voor vaccinatie of bij onzekerheid over de werking: adviseer (ook) de huisgenoten te vaccineren.

Als een patiënt nu niet in aanmerking komt voor vaccinatie maar binnen het griepseizoen (januari t/m maart) nog wel, adviseer dan na de genoemde termijn te vaccineren.