

	<h2>PAD bij Multipel Myeloom</h2>	Versie 1
---	-----------------------------------	----------

Datum:
Gewicht:
Lengte:
LO/m²:
Kuur nr.:

Naamsticker:

Dag 1 t/m 4

Akynzeo geven voor start chemokuur

Medicatie	Oplossing	Tijdsduur	Tijd	Paraaf Dag 1	Paraaf Dag 2	Paraaf Dag 3	Paraaf Dag 4
	250 ml NaCl 0,9%						
Doxorubicine	100 ml NaCl 0,9%	15 min.					
	Infuussysteem doorspoelen						

Aandachtspunten

- Bortezomib: dag 1, 4 8 en 11 s.c.
- Vraag na bij de patiënt of deze gestart is met en een recept heeft voor dexamethason; dexamethason 40 mg. p.o. dag 1 t/m 4, dag 9 t/m 12 en dag 17 t/m 20
- Doxorubicine vormt een neerslag met heparine (let op: bij gebruik van implanteerbare toedieningssystemen, ruim naspoelen met NaCl 0,9%)
- De urine kan rood gekleurd zijn door de doxorubicine
- Controleer voor elke gift of de naald goed in het bloedvat ligt, doxorubicine veroorzaakt ernstige necrose bij extravasatie
- Mondverzorging volgens protocol

Opdrachten

- Voor elke kuur op poli bij hematoloog
- Lab volgens medisch protocol